

Alcool et tabac dans la moyenne, cannabis et autres drogues illicites supérieurs à la moyenne.

L'enquête ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) s'intéresse aux élèves de 16 ans de 39 pays. Les données sont collectées tous les quatre ans depuis 1995. L'exploitation des données françaises de l'étude est pilotée par l'OFDT depuis 1999.

Les résultats français pour les variables d'usage d'alcool et de tabac sont proches de la moyenne des pays participant à ESPAD 2007.


Quatre étudiants sur cinq ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois et 36 % ont connu au moins un épisode d'ivresse pendant cette période. Le volume d'alcool pur consommé lors du dernier jour de consommation (3,6 cl. d'alcool pur) est quelque peu plus faible que la moyenne.

Moins d'un tiers des étudiants (30 %) a fumé des cigarettes durant les 30 derniers jours.

Toutefois, la prévalence de l'usage de cannabis, en France, est clairement supérieure à la moyenne des pays ESPAD, et il en est de même pour l'usage de drogues autres que le cannabis. Près d'un tiers (31 %) des étudiants a expérimenté le cannabis et 11 % ont consommé d'autres drogues.

L'usage d'inhalant (colle, solvant) a été rapporté par 12 %, ce qui est proche de la moyenne, tandis que 15 % des étudiants ont consommé des tranquillisants ou des sédatifs hors prescription médicale, ce qui est plus de deux fois supérieur à la moyenne ESPAD.

L'usage combiné d'alcool et de médicament est, en France, à un niveau identique à celui de la moyenne ESPAD (6 %).



Extraits de : [ESPAD 2007](#)

Traduction : MADT Poitou-Charentes

Les consommations chez les jeunes

EVOLUTION EN FRANCE

Alcool en hausse, tabac, cannabis et polyconsommation en baisse.


Consommation régulière d'alcool en hausse mais ivresses stables. Les chiffres de consommation régulière (13 %) sont en nette augmentation par rapport à 1999 et 2003 (respectivement 8 et 7 %) Concernant les ivresses, dont les niveaux sont stables sur l'ensemble de la période 1999-2007, près d'un jeune sur deux de 16 ans déclare avoir déjà été ivre au cours de sa vie et près d'un tiers au cours de l'année écoulée.

riode, la baisse apparaît plus marquée parmi les filles passant de 24 à 16 % entre 2003 et 2007, alors qu'elle se limite à deux points chez les garçons (de 20 à 18%)

Baisse des niveaux d'usage de cannabis. L'expérimentation de cannabis concerne en 2007 trois élèves de 16 ans sur dix (31 %), soit une légère baisse par rapport à 1999 (35 %). Une décrie plus nette s'observe toutefois pour les consommations régulières (plus de 10 usages par mois).

(plus de 10 usages par mois). La part des usagers réguliers de cannabis est de 3,4 % en 2007 après 5,5 % en 1999 et 6,1 % en 2003. Les garçons sont toujours plus consommateurs de ce produit et l'écart entre les sexes augmente avec la fréquence de consommation.

Evolutions entre 1999 et 2007 de l'usage régulier de tabac (≥ 1 cig./j.), d'alcool (≥ 10 usages/mois), et de cannabis (≥ 10 usages/mois) par sexe, à 16 ans



Source : OFDT-INSEERM, ESPAD 2007

Recul confirmé du tabagisme quotidien. Les résultats 2007 confirment la baisse du tabagisme déjà observée en 2003. A 16 ans, 6 adolescents sur 10 (58 % des garçons et 61 % des filles) déclarent avoir déjà fumé une cigarette au cours de leur vie : ils étaient près de 8 sur 20 en 1999 (79 % des filles et 75 % des garçons). L'usage quotidien est également en net recul : il est passé de 31 % en 1999 à 17 % en 2007. Sur la dernière pé-

Diminution de la polyconsommation d'alcool, de tabac et de cannabis. En dix ans, la proportion de jeunes qui ont expérimenté deux substances (essentiellement alcool et tabac) a nettement baissé de 37% (1999) à 27 % (2007) ; la proportion de ceux qui ont expérimenté les trois substances (alcool, tabac et cannabis) est passée de 33 % (1999) à 29 % (2007).

Extraits de : [OFDT 2009, Tendances n°64](#)